

ANTICHOLIUM – AMPULLEN:

Qualitative und quantitative Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 5 ml enthält: 2,0 mg Physostigminsalicylat und 0,34 mg/5ml Natrium

Liste der sonstigen Bestandteile: Dinatriumedetat; Salzsäure zur pH-Wert-Einstellung; Natriumhydroxid zur pH-Wert-Einstellung; Wasser für Injektionszwecke.

Anwendungsgebiete: Antidot bei lebensbedrohlichen Vergiftungen mit tri- oder tetrazyklischen Antidepressiva, wenn mittels anderer Therapiemaßnahmen der gewünschte Effekt nicht erreicht werden konnte; Behandlung des zentral-anticholinergen Syndrom (ZAS) in der postoperativen Phase, ausgelöst u.a. durch Narkotika, Antihistaminika, Benzodiazepine und andere Psychopharmaka; Behandlung des Alkoholentzugsdelir.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile, Asthma bronchiale; Iritis; Stenosen oder Spasmen des Magen-Darm-Traktes, der Gallenwege oder der Harnwege; Obstruktionsileus; geschlossene Schädel-Hirn-Traumen; Gangrän; Dystrophia myotonica; Depolarisationsblock nach depolarisierenden Muskelrelaxantien; Intoxikationen durch „irreversibel wirkende“ Cholinesterasehemmer; Vergiftungen mit Phosphorsäureestern oder Barbituraten

Pharmakotherapeutische Gruppe: Antidote, ATC-Code: V03AB19.

Inhaber der Zulassung: Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Dr. Franz Köhler Chemie GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 14–22, D-64625 Bensheim www.koehler-chemie.de, info@koehler-chemie.de.

Vertrieb für Österreich: Grünenthal Ges.m.b.H A-2345 Brunn am Gebirge.

Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: Rezept- und apothekenpflichtig. *Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie Angaben über Gewöhnungseffekte entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.* Stand der Information: November 2023