

Fachkurzinformation Ationdo® retard Retardtabletten:

**Ationdo® retard 25 mg Retardtabletten: Qualitative und quantitative**

**Zusammensetzung:** Jede Retardtablette enthält 29,12 mg Tapentadolhydrochlorid entsprechend 25 mg Tapentadol. **Sonstiger Bestandteil:** 1,330 mg Lactose. **Weitere sonstige Bestandteile:** Tablettenkern: Hypromellose, Mikrokristalline Cellulose, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat. Tablettenüberzug: Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Talkum, Macrogol 400, Macrogol 6000, Propylenglycol, Titandioxid (E 171), Eisenoxid gelb (E 172), Eisenoxid rot (E 172).

**Ationdo® retard 50 mg Retardtabletten: Qualitative und quantitative**

**Zusammensetzung:** Jede Retardtablette enthält 58,24 mg Tapentadolhydrochlorid entsprechend 50 mg Tapentadol. **Sonstiger Bestandteil:** 3,026 mg Lactose. **Weitere sonstige Bestandteile:** Tablettenkern: Hypromellose, Mikrokristalline Cellulose, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat. Tablettenüberzug: Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Talkum, Macrogol 6000, Propylenglycol, Titandioxid (E 171).

**Ationdo® retard 100 mg Retardtabletten: Qualitative und quantitative**

**Zusammensetzung:** Jede Retardtablette enthält 116,48 mg Tapentadolhydrochlorid entsprechend 100 mg Tapentadol. **Sonstiger Bestandteil:** 3,026 mg Lactose. **Weitere sonstige Bestandteile:** Tablettenkern: Hypromellose, Mikrokristalline Cellulose, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat. Tablettenüberzug: Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Talkum, Macrogol 6000, Propylenglycol, Titandioxid (E 171), Eisenoxid gelb (E 172).

**Ationdo® retard 150 mg Retardtabletten: Qualitative und quantitative**

**Zusammensetzung:** Jede Filmtablette enthält 174,72 mg Tapentadolhydrochlorid entsprechend 150 mg Tapentadol. **Sonstiger Bestandteil:** 3,026 mg Lactose. **Weitere sonstige Bestandteile:** Tablettenkern: Hypromellose, Mikrokristalline Cellulose, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat. Tablettenüberzug: Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Talkum, Macrogol 6000, Propylenglycol, Titandioxid (E 171), Eisenoxid gelb (E 172), Eisenoxid rot (E 172).

**Ationdo® retard 200 mg Retardtabletten: Qualitative und quantitative**

**Zusammensetzung:** Jede Filmtablette enthält 232,96 mg Tapentadolhydrochlorid entsprechend 200 mg Tapentadol. **Sonstiger Bestandteil:** 3,026 mg Lactose. **Weitere sonstige Bestandteile:** Tablettenkern: Hypromellose, Mikrokristalline Cellulose, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat. Tablettenüberzug: Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Talkum, Macrogol 6000, Propylenglycol, Titandioxid (E 171), Eisenoxid gelb (E 172), Eisenoxid rot (E 172).

**Ationdo® retard 250 mg Retardtabletten: Qualitative und quantitative**

**Zusammensetzung:** Jede Filmtablette enthält 291,20 mg Tapentadolhydrochlorid entsprechend 250 mg Tapentadol. **Sonstiger Bestandteil:** 3,026 mg Lactose. **Weitere sonstige Bestandteile:** Tablettenkern: Hypromellose, Mikrokristalline Cellulose, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat. Tablettenüberzug: Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Talkum, Macrogol 6000, Propylenglycol, Titandioxid (E 171), Eisenoxid gelb (E 172), Eisenoxid rot (E 172), Eisenoxid schwarz (E 172).

**Anwendungsgebiete:** Ationdo retard ist indiziert für die Behandlung starker chronischer Schmerzen bei Erwachsenen, die nur mit Opioidanalgetika angemessen behandelt werden können. **Gegenanzeigen:** Ationdo retard ist kontraindiziert bei Patienten mit einer

Überempfindlichkeit gegen Tapentadol oder einen der sonstigen Bestandteile. In Situationen, in denen Arzneimittel mit  $\mu$ -Opioidrezeptor-Agonismus kontraindiziert sind, wie z.B. bei Patienten mit ausgeprägter Atemdepression (in nicht überwachten Situationen oder bei fehlender Reanimationsausrüstung) und bei Patienten mit akutem oder starkem Bronchialasthma oder Hyperkapnie. Bei Patienten mit bestehendem oder Verdacht auf paralytischen Ileus. Bei Patienten mit akuter Intoxikation durch Alkohol, Schlafmittel (Hypnotika), zentral wirksame Analgetika oder psychotrope Substanzen.

**Pharmakotherapeutische Gruppe:** Analgetika; Opioide; andere Opioide ATC-Code: N02AX06. **Inhaber der Zulassung:** Grünenthal Österreich GmbH, 1060 Wien.

**Verschreibungspflicht / Apothekenpflicht:** Suchtgift, Abgabe nur auf Suchtgiftrezept, apothekenpflichtig.

*Informationen zu Besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. **Stand der Information: Februar 2024***