

Zaldiar® 37,5 mg/325 mg - Filmtabletten: Qualitative und quantitative

Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält 37,5 mg Tramadolhydrochlorid und 325 mg Paracetamol. **Sonstige Bestandteile:** Tablettenkern: Cellulosepulver, vorverkleisterte Stärke, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Maisstärke, Magnesiumstearat.

Filmüberzug: Hypromellose, 1,878 mg Lactosemonohydrat, Titandioxid (E 171),

Macrogol 6000, Eisenoxid gelb (E 172), Propylenglykol, Talk. **Anwendungsgebiete:**

Zaldiar 37,5 mg/325 mg - Filmtabletten sind angezeigt zur symptomatischen Behandlung von mäßig starken bis starken Schmerzzuständen. Die Anwendung von Zaldiar 37,5 mg/325 mg - Filmtabletten soll auf Patienten beschränkt werden, deren mäßig starke bis starke Schmerzen eine Behandlung mit einer Kombination von Tramadol und Paracetamol erfordern.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Tramadol, Paracetamol oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels; akute Vergiftungen mit Alkohol, Schlafmitteln, zentral wirkenden Analgetika, Opioiden oder Psychopharmaka; Patienten, die Monoaminoxidase-Hemmer erhalten oder innerhalb der vergangenen 2 Wochen erhalten haben; schwerwiegende Leberfunktionsstörungen; therapeutisch nicht kontrollierte Epilepsie. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Opiode in Kombination mit Nicht-opioiden Analgetika; ATC Code: N02A J 13. **Inhaber der**

Zulassung: Grünenthal Österreich GmbH, 1060 Wien. **Verschreibungspflicht / Apothekenpflicht:** S1, apothekenpflichtig.

Informationen zu Besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen

Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen und

*Gewöhnungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. **Stand***

der Information: Februar 2024