

Fachkurzinformation Nexium 10 mg magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jeder Beutel enthält: 10 mg Esomeprazol (als Magnesium-Trihydrat). Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: Jeder Beutel enthält 6,8 mg Saccharose und 2,8 g Glucose. Weitere sonstige Bestandteile: *Esomeprazol-Granulat:* Glycerolmonostearat 40-55, Hydroxypropylcellulose, Hypromellose, Magnesiumstearat, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) Dispersion 30%, Polysorbat 80, Zucker-Stärke-Pellets (Saccharose und Maisstärke), Talkum, Triethylcitrat. *Hilfsstoff-Granulat:* Wasserfreie Citronensäure (zur pH-Wert Einstellung), Crospovidon, Glucose, Hydroxypropylcellulose, Eisenoxid gelb (E 172), Xanthangummi. **Anwendungsgebiete:** 'Nexium Suspension zum Einnehmen' ist hauptsächlich angezeigt für: Kinder und Jugendliche: *Kinder von 1 – 11 Jahren:* Gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) - Behandlung einer endoskopisch nachgewiesenen erosiven Refluxösophagitis, symptomatische Behandlung der gastroösophagealen Refluxkrankheit (GERD). *Kinder ab 4 Jahren:* In Kombination mit Antibiotika zur Heilung duodenaler Ulcera bedingt durch Helicobacter pylori. *Erwachsene und Jugendliche ab dem Alter von 12 Jahren:* Für die Anwendungsgebiete bei Patienten ab 12 Jahren siehe Fachinformationen von 'Nexium magensaftresistente Tabletten'. 'Nexium Suspension zum Einnehmen' kann auch bei Patienten, die Schwierigkeiten beim Schlucken dispergierter 'Nexium magensaftresistente Tabletten' haben angewendet werden. **Gegenanzeigen:** Bekannte Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, substituierte Benzimidazole oder einen der genannten sonstigen Bestandteile. Esomeprazol darf nicht zusammen mit Nelfinavir verabreicht werden. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Mittel bei Säure-bedingten Erkrankungen, Protonenpumpenhemmer. **ATC-Code:** A02B C05. **Inhaber der Zulassung:** Grünenthal Österreich GmbH, 1060 Wien. **Verschreibungspflicht / Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig. *Informationen zu Besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.* **Stand der Information: Mai 2024**